

! !!! A partir de 14 ans, présence d'un des parents obligatoire muni des pièces d'identité et livret de famille si noms différents !!!!

SEIN

Tarifs : 55 € anneau
100 € les deux

Date de l'acte de piercing :

Date de la visite de contrôle : 1 mois après l'acte

Date du changement du bijou : 6 mois après l'acte

...Vous allez effectuer un acte de **piercing**

...1 heure après l'acte

Le premier soin ne doit jamais se faire seul, faites vous assister par un proche. Un malaise peut survenir.

1. Nettoyez et désinfectez vos mains.
2. Retirez doucement la compresse, si elle colle mettez un peu d'eau tiède.
3. Imbibez une compresse d'eau tiède, ajouter le savon (**spray vert ou Septivon**), émulsionnez et enlevez tous les dépôts de Bétadine et de sang. Rincez abondamment et séchez (pour le séchage vous pouvez utiliser une boîte de mouchoirs jetables).
4. Ensuite, mettez du **sérum physiologique (spray bleu)**, bougez bien le piercing et séchez.
5. Appliquer la solution antibactérienne sur l'anneau (**spray orange ou Auréomycine**). la **Auréomycine** doit toujours être alternée avec de la **Bépanthène** à raison de 1 semaine l'une et 2 semaines l'autre)) bougez bien le piercing afin de faire pénétrer le produit dans l'orifice et laissez sécher tout seul.

Refaire un soin juste avant de vous coucher.

Une visite un mois après l'acte est conseillée. Cependant nous sommes toujours à votre disposition en cas de nécessité

- En cas de saignement, remettez une compresse, sinon laissez à l'air libre.
- Cependant, portez un vêtement bien propre et de préférence en coton.
- Évitez les vêtements trop serrés.
- Pas d'alcool ni aspirine en cas de maux de tête, prenez du paracétamol.
- Ne touchez pas votre piercing avec les mains sales.
- Pas de bain, mer, sauna et piscine durant 1 à 2 mois.
- Évitez les chocs et sports violents.
- Faites attention lors de l'habillage et du déshabillage.



Une petite inflammation (rougeur) se produira durant environ deux semaines après l'acte.

A ne pas confondre avec une infection Une infection locale peut être initialement négligée parce que confondue avec la réaction inflammatoire siégeant dans la zone du geste après sa réalisation.

La persistance au-delà de ce délai d'une semaine ou l'accentuation des symptômes, l'association d'au moins trois signes parmi l'érythème (rougeur) l'œdème (gonflement), la douleur, l'augmentation de la chaleur locale ou la fièvre, un écoulement purulent ou nauséabond, signalent la présence d'une infection. Il faut consulter un médecin si les symptômes sont trop importants.

En cas de gonflement et si l'anneau vous semble trop serré, passez au plus tôt, nous vous poserons un anneau plus grand.

Il est tout à fait normal, de voir apparaître les premiers temps des dépôts d'aspect blanchâtre. Les enlever doucement à l'aide d'une compresse ou mouchoir propre (pas avec les mains sales) et le sérum physiologique en cours de journée (en dehors des soins du matin et soir)

Faites les soins durant 2 mois, matin et soir, au-delà 1 fois par jour et plus si vous avez encore des dépôts.

Au bout de 6 mois, vous pourrez changer votre bijou, pour le premier changement passez à la boutique, nous vous le ferons.

N'achetez pas de bijou sur les marchés ou magasins discounts, la qualité de l'acier chirurgical n'est pas aux normes.